


výsadba má pár jednoduchých pravidel:

- musí být ze správných druhů
- musí být docela hustá, jinak se zaplevelí (asi tak 8 ks /bm - společně ve všech kategoriích)
- musí být pohnojená a zalitá
- rostliny musíme občas zastříhnout (navržené taxony mají "ostré lokty", bohužel ne všechny stejně, musíme je proto umravňovat, aby ty silnější nezardouslyly ty zbylé)



sortiment pro pásovou výsadbu u plotu

(běžné podmínky kolem Prahy, spíše sucho a slunečno)

keře vysoké (k plotu):

Rosa hugonis
Cornus mas
Viburnum fragrans
Budleia davidii
Amelanchier lamarckii
Jasminum frutex
Cotoneaster salicifolius 'Flocosus'

keře nízké (k zakrytí nohou keřů vysokých):

Spiraea bumalda
Spiraea cinerea
Potentilla fruticosa
Stephanandra incisa 'Crispa'
Mahonia aquifolium
Hypericum patulum 'Hidcote'
Berberis veruculosa
Jasminum nudiflorum

trvalky (před keře nízké):

Geranium macrorhizum
Anemone japonica
Hypericum calycine
Bergenia cordifolia
Hemerocallis flava
Epimedium suphureum
Lysimachia punctata
Hemerocallis flava
Centaurea dealbata
Alchemilla mollis 'Thriller'
Hypericum patulum 'Hidcote'

Privátní zahrada v etapách

- příklady řešení
pásová výsadba kolem
plotu



Alchemilla mollis - kontryhel měkký
V 0.4 Š 0.4 K žlutozelená
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P Z
L L L L K L L L K L L L L O O



Amelanchier ovalis - muchovník oválný
V 4.0 Š 2.0 K bílá
L zelená O oranžovohnědá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P Z
V V V V K L L L L L L L L L O O V



Anemone hupehensis 'Praecox' - sasanka japonská
V 0.8 Š 0.5 K růžová
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P Z
L L L L K L L L P L L L L L L L



Bergenia cordifolia - badan srdčitolistý (det.)
V 0.3 Š 0.5 K růžová
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P Z
L L L L K L L L L L L L L L L L




Buddleia davidii - komule Davidova (sv. fialová)
V 3.0 Š 2.0 K fialová
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P hnědá
V V V V L L L L L L L L L L L L O O V



Centaurea dealbata - chrpa bělavá
V 0.5 Š 0.4 K bílá
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P Z
L L L L K L L L L L L L L L L L



Cornus mas - svída dřín
V 10.3 Š 7.8 K žlutá
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P tm. červená
Z
L L L L P P L L L O O O V V



Cotoneaster salicifolius var. *floccosus* - skalník vrbolistý
V 2.5 Š 1.5 K bílá
L tm. zelená O tm. zelená
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P červená
Z
L L V L V L V K L L L P L L L L L L



Geranium macrorhizum - kakost oddénkatý
V 0.3 Š 0.4 K růžová
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
L L L L L L K L L L L L L L L L L L L



Hemerocallis flava - denivka žlutá
V 0.5 Š 0.6 K žlutá
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
L L L L K L L L L L L L L L L L L L L



Hypericum patulum 'Hidcote' - třezačka rozkladitá
V 1.0 Š 0.6 K žlutá
L tm. zelená O tm. zelená
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
V L V L L L L L L L L L L L L L L L L L



Mahonia aquifolium - mahonie cesmínlolistá (plod)
V 0.8 Š 0.5 K žlutá
L tm. zelená O tm. zelená
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
L L L L L L K K L L L L L L L L L L L



Potentilla fruticosa 'Red Ace' - mochna křovitá
V 1.3 Š 0.7 K oranžová
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
V V V V L L K K L L L P O V P V



Rosa gallica 'Officinalis' - růže keletská lékařská
V 1.2 Š 1.4 K červená
L zelená O žlutá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P červená
Z
V V V V L L K K L L P O V P V



Rosa rugosa 'Hugonis' - růže Hugova
V 2.0 Š 3.0 K sv. žlutá
L zelená O okrová
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
V V V V L L K K L L O O O V V V



Spiraea bumalda - tavolník nízký
V 1.3 Š 1.0 K růžová
L zelená O okrová
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
V V V V L L K K L L O O O V V V



Spiraea cinerea - tavolník popelavý
V 1.3 Š 0.5 K bílá
L zelená O okrová
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
V V V V L L K K L L O O O V V V



Viburnum farreri (květ) - kalina vonná
V 2.0 Š 1.2 K blorůžová
L zelená O žlutohnědá
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P
V V V V K V L L L L L L L L L L L L

ilustrace

blok popisů

kalendář

blok popisů

latinský/ český název

"V" - dosahovaná výška (m)

"Š" - dosahovaná šířka (m)

"K" - barevný efekt Květ

"P" - barevný efekt Plod

"L" - barevný efekt oListění ve vegetaci

"O" - barevný efekt olistění na pOdzim

"Z" - barevný efekt neolistěných částí v Zimě

kalendář

prostorový účinek rostlin v jednotlivých měsících
znázorněný pomocí již použitých symbolů
(memotechnicky: Květ, Plod, List, Opad, Větve)

kalendář - několik příkladů použití

L V prostorový účinek je tvořen olistěním a "mrtvými" částmi rostliny,
rostlina je jako objekt průsvitná (rašící listnatý strom)

L L L L prostorový účinek je tvořen olistěním, které zcela vyplňuje obrys
rostliny (listnatý strom v plné vegetaci)

O O O V prostorový účinek je tvořen olistěním v podzimním zbarvení,
které převážně vyplňuje obrys rostliny (listnatý strom v podzimním zbarvení)

L prostorový účinek je tvořen olistěním, v rozsahu zanedbatelném
proti dosahovaným rozměrům (rašící trvalka)

L L prostorový účinek je tvořen olistěním, v rozsahu 1/2 dosahovaných rozměrů
(trvalka před květem)

K L L prostorový účinek je tvořen olistěním a květy, v podstatném rozsahu vzhledem
k dosahovaným rozměrům (trvalka v květu, kdy květy jsou jednotlivě vyčuhují
nad koberec listů)